

临床助理医师综合笔试模拟题

第 1 题 (单项选择题)

医生诊断为有病但本人否认属于()

- A.病人角色减退
- B.病人角色缺如
- C.病人角色冲突
- D.病人角色强化
- E.病人角色异常

正确答案: B,

第 2 题 (单项选择题)

医疗机构对本单位内被传染病病原体污染的场所、物品以及医疗废物()

- A.予以隔离治疗, 隔离期限根据医学检查结果确定
- B.确诊前在指定场所单独隔离治疗
- C.在指定场所进行医学观察和采取其他必要的预防措施
- D.应当根据病情采取必要的治疗和控制传播措施
- E.必须依照法律法规的规定实施消毒和无害化处置

正确答案: E,

第 3 题 (单项选择题)

胰、十二指肠切除术后, 持续胃肠减压 2 周, 无排气, 腹部无压痛, 肠鸣音减弱, T 波低平, 考虑存在()

- A.低钾血症
- B.等渗性缺水
- C.高渗性缺水

D.低渗性缺水

E.低钙血症

正确答案: A,

第 4 题 (单项选择题)

I 型糖尿病是()

A.内分泌功能亢进

B.内分泌功能减退

C.内分泌功能正常

D.激素受体不敏感

E.下丘脑-垂体-靶腺轴的反馈抑制所致功能减退

正确答案: B,

第 5 题 (单项选择题)

属于医师执业权利的是()

A.医师参加所在机构的民主管理

B.对显著贡献的医师给予表彰或者奖励

C.对急危患者不得拒绝急救处置

D.保护患者的隐私

E.对考核不合格的医师责令其接受培训

正确答案: A,

第 6 题 (单项选择题)

肺末梢组织充气过度导致()

A.肺气肿

B.肺不张

C.肺水肿

D.肺脓肿

E.肺褐色硬化

正确答案：A,

第 7 题 (单项选择题)

以白蛋白为主的是()

A.母乳

B.牛奶

C.全脂奶粉

D.羊奶

E.酸牛奶

正确答案：A,

第 8 题 (单项选择题)

内生软骨瘤可见到()

A.Codman 角

B.葱皮样骨膜反应

C.日光放射样骨膜反应

D.骨端偏心性膨胀性骨吸收

E.短管骨干膨胀性骨吸收夹杂钙化斑

正确答案：E,

第 9 题 (单项选择题)

易发生 DIC 的白血病是()

- A.急性粒细胞白血病未分化型
- B.急性早幼粒细胞白血病
- C.急性单核细胞白血病
- D.急性红白血病
- E.急性淋巴细胞白血病

正确答案： B,

第 10 题 (单项选择题)

属于医学伦理学基本原则的是()

- A.权利、义务
- B.有利、公正
- C.等价交换
- D.医乃仁术
- E.廉洁奉公

正确答案： B,

第 11 题 (单项选择题)

诊断甲亢的首选实验室检查()

正确答案： B,

第 12 题 (单项选择题)

有明显诱因急性起病，病前人格无缺陷，病程间断发作()

- A.精神分裂症预后较好的有关因素
- B.精神分裂症预后较差的有关因素

C.阻止精神分裂症发展成慢性衰退的最好措施

D.精神分裂症的症状特点

E.精神分裂症发病最多年龄

正确答案：A,

第 13 题 (单项选择题)

骨髓象造血干细胞出现分化增殖异常的是()

A.再生障碍性贫血

B.巨幼细胞性贫血

C.缺铁性贫血

D.慢性失血性贫血

E.海洋性贫血

正确答案：A,

第 14 题 (单项选择题)

适用于构成比资料，表示事物内部各部分所占比重可绘制()

A.直方图

B.圆图

C.散点图

D.直条图

E.线图

正确答案：B,

第 15 题 (单项选择题)

肛裂()

- A.排便可加重肛门疼痛，伴大便带鲜血
- B.肛周肿痛伴发热
- C.反复发作的肛周红肿疼痛，窦道外口流出脓性分泌物
- D.肛门疼痛，伴有局部暗紫色肿块
- E.排便时出血、无痛

正确答案：A,

第 16 题 (单项选择题)

治疗斑疹伤寒的首选药物是()

- A.四环素
- B.链霉素
- C.氯霉素
- D.红霉素
- E.土霉素

正确答案：A,

第 17 题 (单项选择题)

进行甲、乙两地 1995 年 5 种不同类型病毒性肝炎发病率的比较，宜采用()

- A.直方图
- B.盲条图
- C.线图
- D.圆形图
- E.散点图

正确答案：B,

第 18 题 (单项选择题)

术后声音变低()

- A.甲状腺危象
- B.喉返神经损伤
- C.喉上神经内支损伤
- D.喉上神经外支损伤
- E.手术区内出血

正确答案: D,

第 19 题 (单项选择题)

铁的主要食物来源()

- A.动物肝脏
- B.奶及奶制品
- C.蔬菜、水果
- D.豆类
- E.粮谷类

正确答案: A,

第 20 题 (单项选择题)

有机磷(对硫磷)农药中毒的洗胃液是()

正确答案: B,

第 21 题 (单项选择题)

慢性肾小球肾炎患者,尿蛋白<1 g/d, 血压应控制在()

- A.120/70 mmHg 以下

B.125/75 mmHg 以下

C.130/80 mmHg 以下

D.140/90 mmHg 以下

E.140/85 mmHg 以下

正确答案： C,

第 22 题 (单项选择题)

幽门梗阻严重呕吐病人应注意防治()

A.高钾血症

B.高钙血症

C.高镁血症

D.低钾血症

E.低钙血症

正确答案： D,

第 23 题 (单项选择题)

能抑制幽门螺杆菌并保护胃黏膜的是()

A.生胃酮

B.米索前列醇

C.法莫替丁

D.胶体次枸橼酸铋

E.奥美拉唑

正确答案： D,

第 24 题 (单项选择题)

骨软骨瘤多见于()

- A.短管骨骨端
- B.短管骨骨干部
- C.长管骨干骺端
- D.长管骨骨干
- E.长管骨骨端

正确答案: C,

第 25 题 (单项选择题)

绞窄性斜疝局部有感染者, 应选的合理手术方式是()

- A.疝囊高位结扎术
- B.Bassini 法修补术
- C.Halsted 法修补术
- D.McVay 法修补术
- E.Ferguson 法修补术

正确答案: A,

第 26 题 (单项选择题)

传导速度最快的是()

- A.窦房结
- B.心房肌
- C.浦肯野纤维
- D.房室结
- E.心室肌

正确答案：C,

第 27 题 (单项选择题)

多见于中年女性的是()

A.腹股沟斜疝

B.腹股沟直疝

C.股疝

D.脐疝

E.切口疝

正确答案：C,

第 28 题 (单项选择题)

胆道蛔虫病的疼痛是()

A.阵发性绞痛

B.持续性疼痛

C.持续性疼痛阵发性加剧

D.持续闷胀痛

E.“钻顶样”绞痛

正确答案：E,

第 29 题 (单项选择题)

气性坏疽的致病菌是()

A.β 溶血性链球菌

B.金黄色葡萄球菌

C.铜绿假单胞菌

D.鲍曼不动杆菌

E.梭状芽孢杆菌

正确答案: E,

第 30 题 (单项选择题)

婴幼儿支气管肺炎所致的支气管扩张症()

A.多发生于左下叶支气管

B.好发部位位于上叶尖后段或下叶背段

C.可见段支气管近端的扩张

D.常伴鼻窦炎及内脏转位

E.血清内可含有抑制支气管柱状上皮细胞纤毛活动物质

正确答案: A,

第 31 题 (单项选择题)

患者女性, 35 岁, 反复出现黏液脓血便 3 年, 近一周来上述症状再发, 伴有腹痛、里急后重、低热、乏力和膝关节痛.体检: 轻度贫血貌, 双小腿前侧可见结节性红斑, 腹软, 左下腹有压痛, 未触及包块, 肠鸣音活跃.化验: 便常规有大量脓细胞和红细胞, 血沉 30mm/h

此病人最可能的诊断是()

A.克罗恩病

B.溃疡性结肠炎

C.阿米巴痢疾

D.细菌性痢疾

E.肠结核

正确答案: B,

第 32 题 (单项选择题)

男性装卸工人，40岁，腰扭伤，经治疗腰痛缓解，但仍有左下肢麻痛并放射，查体腰背肌痉挛，沿坐骨神经走行有压痛，直腿抬高试验阳性

如果病史较长，反复发作，其治疗方法应考虑()

- A.牵引
- B.按摩
- C.手术
- D.理疗
- E.封闭

正确答案：C,

第 33 题 (单项选择题)

女，37岁，自缢后呼吸、心跳停止，经抢救复苏后，为防治脑水肿给予脱水、降温治疗，维持肺功能稳定。

关于脱水治疗，不正确的是()

- A.保持正常输液量
- B.20%甘露醇 250 ml 静脉内快速滴入，每天 2—4 次
- C.必要时加用速尿 20—40 mg/次静脉注射
- D.应定期检查血生化，以免引起水电解质紊乱
- E.脱水治疗应持续 2—3 天

正确答案：E,

第 34 题 (单项选择题)

女性，35岁，体检发现颈前肿块，无自觉不适。查体：甲状腺右叶上极可触及 2.0cm×2.0cm 结节，质地较硬，表面光滑，无压痛，可随吞咽上下活动。

明确诊断需()

- A.颈部 X 线平片检查

B.颈部 B 超检查

C.CT 检查

D.核素扫描检查

E.穿刺细胞学检查

正确答案: E,

第 35 题 (单项选择题)

女性, 19 岁.近 2 周来发热 38℃左右, 伴恶心、呕吐、腹泻.遂出现心悸, 胸痛, 呼吸困难, 晕厥发作.体检发现: 面色苍白, 精神萎靡.心率 40 次/分, 律齐, 心尖部第一心音低钝, 且可闻及大炮音.临床诊断病毒性心肌炎

心电图表现最可能是()

A.窦性心动过缓

B.I 度房室传导阻滞

C.II 度房室传导阻滞

D.III 度房室传导阻滞

E.室内传导阻滞

正确答案: D,

第 36 题 (单项选择题)

女性, 40 岁, 左乳外上象限 4 cm×3 cm 肿块, 距乳头距离 5 cm, 可推动, 但病人双手叉腰时肿块活动度明显受限, 左腋窝未扪及肿大淋巴结。

术后选择 CAF 方案辅助化疗, 应使用的周期数是()

A.2

B.6

C.10

D.14

E.18

正确答案: B,

第 37 题 (单项选择题)

男, 40 岁, 头痛、头晕 1 年, 1 周来加重伴心悸、乏力、鼻出血及牙龈出血来诊。查体: 血压 170/110mmHg, 皮肤黏膜苍白, Hb65g/L, PLT148×10⁹/L, 尿蛋白(+++), 尿红细胞 3~5/HP, BUN38mmol/L, Scr887μmol/L, Ccr10ml/min, 肾脏 B 超左肾 8.9cm×4.6cm×4.1(cm), 右肾 8.7cm×4.4cm×4.1cm, 双肾皮质变薄

患者不应该出现的电解质和酸碱平衡失调是()

A.低钙血症

B.高镁血症

C.低钠血症

D.低镁血症

E.代谢性酸中毒

正确答案: D,

第 38 题 (单项选择题)

女性, 50 岁, 恶心呕吐、腹泻 3 天, 意识模糊、烦躁不安 1 天急诊入院。查体: BP100/65 mHg, 神志恍惚, 巩膜轻度黄染, 颈项部可见数枚散在的蜘蛛痣。心肺未见异常, 腹软, 肝肋下未触及, 脾肋下 2 cm。双上肢散在出血点, Hb 85 g/L, WBC /L, 血糖 6.8 mmol/L, 尿糖(+), 尿酮体(-), 尿液镜检(-)。

该病例最可能的诊断()

A.糖尿病酮症酸中毒

B.肝性脑病

C.尿毒症

D.高渗性非酮症糖尿病昏迷

E.脑血管意外

正确答案: B,

第 39 题 (单项选择题)

初孕妇，25 岁，停经 50 天，阵发性腹痛伴阴道流血 3 天，宫口开大 1cm，羊膜囊堵塞宫口，子宫孕 50 天大小。

最有可能的诊断是()

- A.先兆流产
- B.稽留流产
- C.难免流产
- D.完全流产
- E.习惯性流产

正确答案：C,

第 40 题 (单项选择题)

男，20 岁，神志不清 2 小时入院，既往患 1 型糖尿病 5 年，长期皮下注射胰岛素。近 3 天因腹泻而停用。体检：血压 70/50mmHg，皮肤中度失水征，呼吸深大，有烂苹果味，心率 130 次/分

需立即采取的治疗措施是()

- A.静脉滴注 5%碳酸氢钠
- B.纠正电解质紊乱
- C.补液并恢复皮下注射胰岛素
- D.补液加有效的抗生素
- E.补液同时静脉滴注胰岛素

正确答案：E,

第 41 题 (单项选择题)

7 个月患儿，呕吐腹泻 4 天，大便 10-15 次/天，呈蛋花汤样，尿量极少，皮肤弹性差，呈花纹状，眼窝、前囟明显凹陷，心音低钝，四肢厥冷，大便镜检偶见白细胞，血清钠为 124 mmol/L。

该患儿的诊断为()

- A.中度等渗性脱水
- B.重度等渗性脱水
- C.中度低渗性脱水
- D.重度低渗性脱水
- E.重度高渗性脱水

正确答案：D,

第 42 题 (单项选择题)

女性，30岁，因食欲不振、尿少、腹胀2个月住院。19岁检查时曾发现肝大。查体：消瘦、腹膨隆、肝未触及、脾肋下3cm，腹部移动性浊音阳性。腹水检查：比重1.012，粘蛋白定性试验(-)，细胞数。

对本患者腹水的治疗，原则上不采用()

- A.利尿剂
- B.静滴白蛋白
- C.腹腔穿刺放液
- D.腹水浓缩回输
- E.腹腔-颈内静脉分流术

正确答案：C,

第 43 题 (单项选择题)

4岁患儿，发热、头痛、呕吐3天，抽搐1次。入院查体：体温39%，面色苍白，血常规示：白细胞 $22 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞占90%

为明确诊断，最为必要的检查是()

- A.血常规
- B.血培养
- C.头颅CT

D.脑脊液检查

E.脑电图

正确答案: D,

第 44 题 (单项选择题)

50 岁男性, 外伤后致胫腓骨中 1/3 骨折, 手法复位后, 长腿石膏管型外固定.4 周后, 石膏管型于膝部有折断, 未给处理, 3 个月后 X 线片复查见骨折略有移位, 骨折线清晰

影响骨折愈合的最主要的原因是()

A.年龄较大

B.骨折段血液供血不足

C.伤口有感染

D.周围软组织挫伤严重

E.骨折固定不确实

正确答案: E,

第 45 题 (单项选择题)

女性, 24 岁。高热、寒战、咳脓痰 2 天。查体体温 39.5℃, 左肺闻及湿啰音, 胸片示左肺下叶大片状致密影。给予抗生素治疗症状无好转, 1 天后症状加重, 胸痛伴呼吸困难, 左胸呼吸音低, 胸片示左胸腔积液。

现在诊断应为()

A.重症肺炎

B.肺炎合并气胸

C.肺炎合并急性脓胸

D.肺炎合并反应性胸膜腔积液

E.结核性渗出性胸膜腔积液

正确答案: C,

第 46 题 (单项选择题)

5 岁患儿突发寒战高热，左大腿下端深压痛，患肢不敢活动，白细胞总数升高

确诊后须立即采取的治疗方法是()

- A.加强营养
- B.静滴足量有效抗生素
- C.少量多次输血
- D.患肢皮牵引
- E.患肢石膏固定

正确答案：B,

第 47 题 (单项选择题)

男性，74 岁，右侧腹股沟区可复性肿块 8 年。查体：病人直立时，在腹股沟内侧端、耻骨结节上外方有一 4cm×4cm 半球形肿物，未进入阴囊，平卧后自行消失

该病人最有效的治疗方法是()

- A.用棉线束带或绷带压迫内环口
- B.禁烟、控制呼吸道感染
- C.注射硬化剂
- D.疝修补术
- E.疝囊高位结扎术

正确答案：D,

第 48 题 (单项选择题)

患儿 6 岁，跌倒时手掌着地。查体：肘关节半屈状，肘部明显肿胀及压痛，皮下有瘀斑，呈向外突出畸形，桡动脉搏动减弱，肘后三角存在，被动伸指时有剧烈疼痛

患者最有可能的诊断是()

A.伸直型肱骨髁上骨折

B.桡骨小头半脱位

C.肘关节脱位

D.屈曲型肱骨髁上骨折

E.尺骨鹰嘴骨折

正确答案：A,

第 49 题 (单项选择题)

急性脊髓炎患者七天后，双下肢完全瘫痪伴大小便失禁。骶部皮肤小片无痛性红肿区，无溃破，无发热。

最适宜的骶部皮肤治疗()

A.全身应用抗菌素

B.加大地塞米松量

C.留置导尿管

D.局部麻醉后，清创

E.温水轻揉，涂以 3.5%安息香酊

正确答案：E,

第 50 题 (单项选择题)

男性，30岁，间断上腹痛10余天，晨起突然呕血400ml，并排柏油便4次，自觉头晕心悸。入院测血压13/8kPa(98/60mmHg)，心率108次/分，肝脾未触及，肠鸣音亢进，10年前因黄疸型肝炎住院治疗痊愈。半年前体检示乙肝抗原、抗体检查阴性，丙肝抗体检查阴性，近3年间歇出现上腹痛，多于春秋季节发作。

该患者最可能的诊断是()

A.肝硬化食管静脉曲张破裂出血

B.消化性溃疡出血

C.急性胃黏膜病变

D.食管贲门黏膜撕裂症

E.胃癌出血

正确答案：B,