

扬州大学

2020年硕士研究生招生考试初试试题（A卷）

科目代码 308 科目名称 护理综合

满分 300

注意：①认真阅读答题纸上的注意事项；②所有答案必须写在答题纸上，写在本试题纸或草稿纸上均无效；③本试题纸须随答题纸一起装入试题袋中交回！

一、单项选择题（在每小题的五个备选答案中，选出一个正确答案，并将其代码填在答题纸上，共 60 小题，每小题 1.5 分，共 90 分）

1. 王小姐，58岁，因病情需要行气管切开，考虑其病房环境时应特别注意
A. 保持适宜的温度 B. 创造安静的环境 C. 定时通风
D. 合理采光 E. 保持适宜的湿度
2. 医院病床之间的距离不少于
A. 0.5m B. 1m C. 1.5m
D. 2m E. 3m
3. 患者金某，女性，66岁，体重98kg，因急性心肌梗死而急诊入院。入院查体：神志清楚，心率120次/分，律齐。心电图提示前壁广泛性缺血性改变。此时，护士最好给患者安置
A. 平卧位 B. 中凹卧位 C. 半坐卧位
D. 头低脚高位 E. 俯卧位
4. 协助患者向平车挪动的顺序为
A. 上身、臀部、下肢 B. 上身、下肢、臀部 C. 下肢、臀部、上身
D. 臀部、下肢、上身 E. 臀部、上身、下肢
5. 患者许某，患肝硬化伴食管、胃底静脉曲张。入院后不久患者主诉腹部不适、恶心，继而呕吐大量鲜血。查体：呼吸急促，脉搏细速，血压60/40mmHg，冷汗。此时，护士应立即将患者安置为
A. 平卧位 B. 仰卧屈膝位 C. 中凹卧位
D. 侧卧位 E. 头低足高位
6. 用紫外线消毒病室，下列选项中错误的一项是
A. 卧床患者须保护双眼及皮肤
B. 使用前应擦净灯管表面的灰尘
C. 灯亮5~7min开始计时
D. 紫外线灯管使用超过500h应更换灯管
E. 照射时间为30~60min
7. 王先生，70岁，因“支气管哮喘”入院。病愈出院后，其床垫消毒宜采用
A. 燃烧法 B. 紫外线灯照射法 C. 流通蒸汽消毒法
D. 含氯消毒剂喷洒法 E. 微波消毒法
8. 下列哪些疾病需进行严密隔离？
A. 百日咳 B. 疟疾 C. SARS
D. 乙型脑炎 E. 登革热
9. 下列哪项违背了无菌技术操作原则？
A. 打开无菌容器盖时，盖的内面向上放置
B. 手持无菌容器时，应托住边缘部分
C. 倒取无菌溶液时，手不可触及瓶塞的内面

- D. 揭开无菌盘的盖巾时，双手捏住盖巾的上层外面双角
E. 戴手套的手不可触及另一手套的内面
10. 有关过氧乙酸的存储和使用的叙述中，错误的是
A. 放置于阴凉处
B. 用色暗带盖塑料容器存储
C. 提前配制好各种浓度的溶液备用
D. 浓度为 0.2% 的用于一般物品的表面消毒
E. 浓度为 15% 的用于空气消毒
11. 烧伤病区属于 B 类环境，要求空气中的菌落总数不超过
A. $10\text{cfu}/m^3$ B. $50\text{cfu}/m^3$ C. $100\text{cfu}/m^3$
D. $200\text{cfu}/m^3$ E. $500\text{cfu}/m^3$
12. 周先生，48岁，诊断为“肺结核”。消毒其床头柜应用
A. 日光曝晒 4h B. 臭氧灭菌灯照射 20min
C. 含有效氯 0.2% 的消毒液喷洒 60min
D. 含有效氯 0.2% 的消毒液擦拭 15min
E. 84 消毒液擦拭 5min
13. 浸泡无菌持物钳的消毒剂应浸泡在钳轴关节以上
A. 1~2 cm B. 2~3 cm C. 3~4 cm
D. 4~5 cm E. 5~6 cm
14. 用紫外线灯进行物品表面消毒时，消毒时间为
A. 5~10 min B. 10~20 min C. 20~30 min
D. 30~40 min E. 40~50 min
15. 戴无菌手套，下列描述正确的是
A. 戴手套前，先检查手套的号码
B. 戴手套前，可不必洗手，但一定要修剪指甲
C. 未戴手套的手可触及手套的外面
D. 已戴手套的手可触及另一手套的内面
E. 戴好手套后两手应置于胸部以上水平
16. 下列哪项疾病应进行接触隔离？
A. 麻疹 B. 破伤风 C. 百日咳
D. 流行性乙型脑炎 E. 甲型肝炎
17. 清除治疗盘内的碘渍宜选用
A. 84 消毒液 B. 75% 乙醇 C. 40% 甲醛
D. 2% 戊二醛 E. 0.2% 过氧乙酸
18. 能杀灭所有微生物以及细菌芽孢的方法是
A. 清洁 B. 消毒 C. 抑菌
D. 灭菌 E. 抗菌
19. 防患者坠床的最佳措施是
A. 约束肩部 B. 约束膝部 C. 床档
D. 约束踝部 E. 约束腕部
20. 下列关于剪切力的叙述不正确的是
A. 与体位有关 B. 由垂直压力和摩擦力相加而成
C. 由剪切力造成的皮肤损害早期不易发现

D. 半卧位时床头抬高应大于 30° , 避免剪切力产生

E. 长期坐轮椅者应保持正确坐姿, 防止身体下滑而产生剪切力

21. 患者女性, 66岁。有慢性哮喘史10年, 2日前上呼吸道感染使病情加重, 昨夜间咳嗽加重, 痰量增多。查体: 神志清, 口唇轻度发绀, 桶状胸, 两肺叩诊过清音, 呼吸低音。动脉血气分析: $\text{PaO}_2 70\text{mmHg}$, $\text{PaCO}_2 42\text{mmHg}$ 。经治疗后病情缓解。护士进行健康教育, 嘱患者回家后首先应做到

- A. 加强腹式呼吸 B. 定量行走锻炼 C. 长期家庭氧疗
D. 避免吸入有害气体 E. 保持室内适当的温、湿度

22. 患者女性, 65岁。肺心病病史10年。近日病情逐渐加重, 情绪不稳, 夜不能寐。护士给张女士做睡眠护理时不恰当的措施是

- A. 协助患者采取舒适卧位 B. 嘱患者生活要有规律
C. 减少白天的睡眠时间和次数 D. 睡前多与患者讨论患者感兴趣的话题
E. 必要时按医嘱慎用镇静、催眠剂

23. 患者女性, 22岁。因咳嗽、痰中带血3日, 以“支扩”收住院。今晨突然大咳血100ml。该患者最主要的护理诊断或合作性问题是

- A. 焦虑 B. 活动无耐力
C. 潜在的并发症: 窒息 D. 知识缺乏 E. 有感染的危险

24. 患者女性, 65岁。慢性支气管炎病史20余年, 近半年来呼吸困难加重, 下肢水肿, 诊断为慢性肺心病。血气分析: $\text{PaO}_2 52\text{mmHg}$, $\text{PaCO}_2 64\text{mmHg}$, 给患者氧疗时应采取

- A. 立即吸入高浓度氧 B. 低浓度、低流量间断给氧
C. 低浓度、低流量持续给氧 D. 短期给氧 E. 高流量给氧

25. 患者男, 76岁, COPD病史5年。因受凉并发肺部感染咳嗽、咳痰入院。血气分析: $\text{PaO}_2 50\text{mmHg}$, $\text{PaCO}_2 55\text{mmHg}$, $\text{pH} 7.35$ 。该患者最可能的诊断是

- A. 支气管哮喘 B. 支气管肺炎 C. 支气管扩张
D. I型呼吸衰竭 E. II型呼吸衰竭

26. 患者, 男, 70岁。慢性阻塞性肺疾病。出院后拟进行长期家庭氧疗, 护士应告知患者每天吸氧的时间不少于

- A. 5小时 B. 8小时 C. 10小时 D. 12小时 E. 15小时

27. 患者女性, 59岁, 风心病伴二尖瓣狭窄6年, 伴心房颤动5年, 无明显原因突然出现意识障碍, 最可能的原因是

- A. 发生室颤 B. 心排出量减少, 脑供血不足
C. 心房血栓脱落, 脑栓塞 D. 高凝状态, 脑血栓形成
E. 发生房颤

28. 左心衰竭主要表现为

- A. 肺循环淤血和心排血量降低所致的临床综合症 B. 水肿
C. 胃肠淤血 D. 颈静脉征 E. 肝颈静脉回流征阳性

29. 患者女性, 56岁。高血压病3年, 今日血压急剧升高, 收缩压高于200mmHg, 并且出现头痛、心悸, 首先考虑

- A. 高血压危象 B. 高血压脑病 C. 高血压性脑出血
D. 急性左心衰 E. 短暂性脑缺血发作

30. 下列哪一项不是心肌梗死的并发症
A. 胸膜炎 B. 梗死后综合征 C. 心脏破裂
D. 室壁瘤 E. 二尖瓣脱垂
31. 永久起搏器安装术后术侧上肢至少多长时间方可上抬
A. 2个月 B. 3个月 C. 4个月 D. 5个月 E. 6个月
32. 患者女性，65岁。有高血压病史10年，最近骑车上班时感胸闷、乏力、气急，休息后缓解。该患者的心功能为
A. 一级 B. 二级 C. 三级 D. 四级 E. 五级
33. 下列哪项是急性糜烂出血性胃炎的首发症状
A. 上腹不适 B. 恶心、呕吐 C. 食欲下降
D. 反酸、嗳气 E. 呕血和黑便
34. 患者男性，46岁，有胃溃疡病史近10年。近2个月疼痛加剧且失去节律性，无呕吐，服用多种抑酸剂不能缓解。查体：腹部平软，上腹部轻压痛，可扪及肿块，质硬。为确诊病因应首选
A. 大便隐血试验 B. X线钡餐检查 C. 幽门螺杆菌检查
D. 胃镜检查 E. 胃液分析
35. 消化道出血临床最常见的病因是
A. 胃癌 B. 急性糜烂性胃炎 C. 消化性溃疡
D. 胃粘膜脱垂 E. 促胃液素瘤
36. 外科病人中最易发生的缺水类型是
A. 低渗性缺水 B. 等渗性缺水 C. 高渗性缺水
D. 原发性缺水 E. 继发性缺水
37. 胃溃疡并幽门梗阻病人，反复呕吐半个月，应尤其注意其出现
A. 代谢性酸中毒 B. 代谢性碱中毒 C. 呼吸性酸中毒
D. 呼吸性碱中毒 E. 代谢性酸中毒合并呼吸性酸中毒
38. 肠内营养并发症与输入速度及溶液浓度有关的是
A. 误吸 B. 腹胀、腹泻 C. 肠炎
D. 肠道细菌移位 E. 胆囊结石
39. 休克早期的主要临床特征是
A. 血压下降 B. 脉压缩小
C. 脉搏细速 D. 四肢冰冷
E. 尿量减少
40. 不符合外科感染特点的是
A. 多数由单一细菌引起感染 B. 病变以局部炎症为主
C. 常与创伤有关 D. 常需手术治疗
E. 可分为特异性和非特异性感染。
41. 手术后卧位，下列哪一项是错误的
A. 全麻术后未醒的病人，应去枕平卧，头向一侧
B. 颈、胸、腹术后，一般取30~45°半卧位，膝关节稍屈曲

C. 腰麻病人，去枕平卧	D. 颅脑手术取平卧位
E. 脊柱手术一般平卧硬板床	
42. 颅内压明显增高时禁止做腰穿是为了避免	
A. 颅内压持续增高	B. 脑脊液漏
C. 小脑扁桃体疝	D. 颞叶钩回疝
E. 颅外疝	
43. 腹腔穿刺吸出的血液不凝固提示	
A. 实质脏器损伤	B. 胃肠道破裂
C. 穿入血管或血肿内	D. 膀胱损伤
E. 绞窄性疝	
44. 毕II式胃大部分切除术后并发吻合口梗阻时的呕吐特点是	
A. 呕吐胃内容物，不含胆汁	B. 呕吐食物和胆汁
C. 频繁呕吐，量少不含胆汁	D. 呕吐量大，呕吐物为带酸臭味的宿食
E. 呕吐物带臭味	
45. 男性，14岁，高空坠落伤致腰椎骨折，专科检查示左下肢肌力4级，提示该肢体	
A. 肌力正常	B. 有轻度肌收缩，无关节活动
C. 有肌收缩，关节有活动，但不能对抗引力	
D. 可对抗引力，但不能抗拒阻力	
E. 对抗中度阻力时，有完全关节运动幅度，但肌力较弱	
46. 亚低温治疗时体温降至多少合适：	
A. 应用药物和物理方法降低病人体温至30-32℃	
B. 应用药物和物理方法降低病人体温至32-35℃	
C. 应用药物和物理方法降低病人体温至28-32℃	
D. 应用药物和物理方法降低病人体温至34-36℃	
E. 应用药物和物理方法降低病人体温至28-36℃	
47. 颅内压的调节和代偿主要通过以下哪个方面来完成？	
A. 脑血容量，颅内血液被排挤到颅外血液循环	
B. 脑血管收缩，减少脑血流量	
C. 脑组织被压缩使体积缩小	
D. 脑脊液或血液向颅外转移	
E. 脑血管扩张，减少脑血流量	
48. 以引流积气为目的的胸腔闭式引流管放置于	
A. 锁骨中线第2肋间	B. 锁骨中线第3肋间
C. 锁骨中线第4~5肋间	D. 腋中线和腋后线之间第6或第7肋间
E. 腋前线6~8肋间	
49. 女性，45岁，脐周痛12小时伴恶心，呕吐，吐物为胃内容，量少，2小时前扩散至全腹痛，右下腹部压痛，反跳痛，腹肌紧张，以右下腹为著，结肠充气试验(+)，白细胞数 $26\times 10^9/L$ ，应考虑	
A. 急性胰腺炎	B. 急性胆囊炎
C. 右输尿管结石	D. 右输卵管妊娠破裂
E. 急性阑尾炎穿孔	
50. 颈椎前路手术后出现呼吸困难多发生于术后	
A. 12小时	B. 1-3天内
C. 3天后	D. 5天后

E. 7 天后

51. 认为“护理是一门专门的职业”是哪一阶段的观点？
A. 以疾病为中心阶段 B. 以患者为中心阶段
C. 以人的健康为中心的阶段 D. 以清洁卫生为中心阶段
E. 以上都不是
52. 在流感流行期间，某社区医疗点为了更好地预防该传染病，让社区护士深入各个家庭，教会居民用食醋熏蒸消毒住所。此项护理工作内容属于
A. 基础护理 B. 专科护理
C. 社区护理 D. 临床护理
E. 护理教育
53. 患病后患者主要的心理反应不包括
A. 自尊心加强 B. 猜疑心加重
C. 焦虑和抑郁 D. 踌躇徘徊
E. 害羞和罪恶感
54. 初级卫生保健的具体任务不包括
A. 临床治疗工作 B. 预防性服务
C. 康复指导 D. 保护健康的服务
E. 促进健康的服务
55. 因过度悲伤引起的失眠、血压升高属于哪种影响健康的因素所致？
A. 生物因素 B. 心理因素
C. 物理环境因素 D. 社会环境因素
E. 行为方式
56. 小刘，学生，在课间活动时不慎摔倒致尺桡骨骨折，入院治疗后病情稳定，但因不能参加期末考试情绪一直非常低落，此时护士应特别注意满足患者的（ ）。
A. 生理需要 B. 安全需要
C. 爱与归属的需要 D. 尊重的需要
E. 自我实现的需要
57. 按照人类基本需要层次论原则，下列哪项基本需要的排序是正确的（ ）
A. 保持良好的人际关系、保护隐私、氧气和水、希望工作稳定、实现自己的理想
B. 实现自己的理想、保护隐私、希望工作稳定、保持良好的人际关系、氧气和水
C. 氧气和水、保持良好的人际关系、希望工作稳定，实现自己的理想、保护隐私
D. 希望工作稳定、保持良好的人际关系、氧气和水、实现自己的理想、保护隐私
E. 氧气和水、希望工作稳定、保持良好的人际关系、保护隐私、实现自己的理想
58. 口腔期在小儿的年龄为（ ）。
A. 0~6 个月 B. 0~1 岁 C. 0~2 岁 D. 0~3 岁 E. 1~3 岁
59. 一位患者有性别认同困难，根据弗洛伊德的观点，其性心理发展障碍主要在（ ）
A. 口欲期 B. 肛欲期 C. 性蕾期 D. 潜伏期 E. 生殖期
60. 弗洛伊德人格结构理论中“原始的人”指的是哪一层次（ ）
A. 本我 B. 本能 C. 自我 D. 超我 E. 超能

二、多项选择题（在每小题的五个备选答案中，选出两个至五个正确答案，并将其代码分别填在答题纸上，多选、少选、错选均不得分，共 30 小题，每小题 2 分，共 60 分）

1. 病室湿度过低的表现是
A. 空气干燥 B. 人体蒸发大量的水分
C. 可引起患者口舌干燥，咽痛，烦渴等表现
D. 对呼吸道疾患或气管切开的患者尤为不利
E. 患者尿量排出增加，加重肾脏的负担
2. 不需进行卫生处置的入院患者有
A. 严重心脏病患者 B. 甲状腺功能亢进者
C. 即将分娩者 D. 急性白血病患者 E. 胃溃疡穿孔待手术者
3. 有关体温昼夜生理性变化的叙述，正确的是
A. 傍晚 6~10 时体温最高 B. 昼夜体温变动范围不超过 1.0℃
C. 由内在的生物节律决定 D. 清晨 2~6 时体温最低
E. 与生物钟有关
4. 交替脉常见于
A. 高热 B. 高血压性心脏病
C. 主动脉瓣关闭不全 D. 大出血
E. 冠心病
5. 医院饮食包括？
A. 治疗饮食 B. 试验饮食
C. 基本饮食 D. 软食
E. 普食
6. 下列说法正确的是
A. 集尿袋每周更换一次 B. 倾倒尿液时，集尿袋低于耻骨联合
C. 引流管勿受压、扭曲 D. 导尿管每日更换一次
E. 患者离开床位开始活动时拔除尿管
7. 尿失禁患者常见的并发症有
A. 尿路感染 B. 压疮
C. 盆腔炎 D. 肾小球肾炎
E. 肾结核
8. 口服对牙齿有腐蚀作用和使牙齿染色的药物时应注意
A. 用吸管吸入 B. 避免与牙齿接触
C. 服药后立即漱口 D. 口服后多饮水
E. 饭前服药
9. 与大量输血有关的反应是
A. 循环负荷过重 B. 出血倾向
C. 枸橼酸钠中毒 D. 病毒性肝炎
E. 体温过低
10. 防止输血发生溶血反应的护理措施是
A. 认真核对献血者和受血者姓名 B. 核对血型鉴定和交叉配血结果
C. 取血后勿剧烈震荡 D. 库血保存不超过 3 周
E. 认真检查血液质量，不用变质血
11. 关于咳嗽、咳痰护理，下列措施中正确的是
A. 保持室内空气新鲜、清洁 B. 协助痰多的卧床患者翻身
C. 痰稠不易咳出时应多饮水 D. 痰多、体弱、无力咳嗽者施行体位引流

- E. 咳脓痰者注意口腔护理
12. 心跳呼吸骤停紧急处理原则正确的是
A. 首先心电图确诊，然后处理 B. 迅速有效的人工呼吸
C. 立即进行有效的胸外按压 D. 立即建立静脉通道
E. 根据情况选用合适药物，使心脏复苏
13. 肝性脑病昏迷期病人护理措施正确的是
A. 病人取仰卧位，头偏向一侧以防舌后坠阻塞呼吸道
B. 保持呼吸道通畅 C. 做好基础护理，防压疮
D. 尿潴留病人留置尿管，记录尿量、颜色、气味
E. 给病人做肢体的被动运动，防止静脉血栓形成
14. 下列关于血尿正确的有
A. 尿呈现红色即为血尿 B. 血尿出现时，尿外观会呈现红色
C. 新鲜尿沉渣每高倍镜视野红细胞大于3个即为血尿
D. 肾小球源性的血尿一般尿中红细胞大小形态均一
E. 尿路感染时可有血尿出现
15. Glasgow 昏迷评定量表是从以下哪几个方面进行评定的
A. 感觉 B. 意识 C. 睁眼反应 D. 言语反应 E. 运动反应
16. 巨幼细胞性贫血饮食治疗中说法正确的是
A. 叶酸缺乏者应多吃绿叶蔬菜、水果、谷类和动物肉类
B. 维生素B12缺乏者要多吃动物肉类、肝、肾、禽蛋以及海产品
C. 食物烹饪时不宜温度过高或时间过长，且烹饪后不宜久置
D. 对于胃肠道症状明显或吸收不良的患者，可建议其少量多餐、细嚼慢咽，进食温凉、清淡的软食
E. 出现口腔炎或舌炎的患者，应注意口腔清洁，饭前、饭后用漱口液漱口
17. 再生障碍性贫血预防感染的措施主要有
A. 保持病室内空气清新，物品清洁，定期使用消毒液擦拭室内家具、地面，并用紫外线或臭氧照射消毒
B. 限制探视人数及次数，避免到人群聚集的地方或与上呼吸道感染的病人接触
C. 督促患者养成进餐前后、睡前、晨起用漱口水交替漱口的习惯
D. 保持皮肤清洁、干燥，勤沐浴，各种侵入性操作注意无菌原则
E. 睡前、便后用1:5000高锰酸钾溶液坐浴，保持大便通畅
18. 李某，女，22岁，未婚。临床确诊为系统性红斑狼疮，面部有典型蝶形红斑。下列护理措施正确的是
A. 避免烈日下活动 B. 外出时戴宽边帽
C. 局部用清水清洗 D. 脱屑处用碱性肥皂清洗 E. 勿用刺激性化妆品
19. 传染病的基本特征包括
A. 有病原体 B. 有传染性 C. 有流行病学特征
D. 有潜伏性 E. 感染后免疫

20. 乙型肝炎传播途径主要包括
A. 输血或血制品 B. 粪-口途径 C. 注射途径
D. 母婴传播 E. 日常生活密切接触
21. 机体对创伤、手术或感染的代谢反应主要表现为
A. 水电解质及酸碱失衡 B. 正氮代谢平衡
C. 高血糖 D. 脂肪利用增加
E. 蛋白质分解加速
22. 针对肠内营养可能发生吸入性肺炎，应该
A. 开始肠内营养时，必须明确营养管的位置
B. 可通过X线证实鼻胃管的位置 C. 灌注营养液时，病人应采取半卧位
D. 发现有误吸现象，应立即停止肠内营养
E. 对存在误吸危险的病人，应改为经十二指肠或空肠喂养
23. 甲状腺大部分切除术后发生呼吸困难和窒息与下列哪项因素有关
A. 手术创伤的应激诱发的危象 B. 切口内出血压迫气管
C. 气管软化塌陷 D. 喉头水肿
E. 双侧喉返神经损伤所致声带麻痹
24. 郑某，男性，69岁，右侧腹股沟斜疝嵌顿2小时，经手法复位成功，护理时需要重点观察
A. 疝块有无再次嵌顿 B. 呼吸、脉搏、血压
C. 有无腹痛、腹膜刺激征 D. 有无呕吐、腹胀、发热
E. 疝块部位红、肿、痛
25. 胸腔闭式引流拔管指
A. 置管引流48~72小时，引流瓶中无气体溢出且颜色变浅；
B. 24小时引流液量少于50ml、脓液少于30ml；
C. 24小时引流液量少于30ml、脓液少于10ml；
D. 24小时引流液量少于50ml、脓液少于10ml；
E. 胸部X线摄片显示肺膨胀良好无漏气。
26. 关于石膏固定的护理要点，下面正确的是
A. 适当抬高患肢 B. 观察肢体远端血液循环
C. 疼痛时，及时给予止痛剂 D. 石膏未干，不可用手指扶持，以防压痕
E. 可进行肌舒缩活动及固定外的关节伸屈活动
27. 人工肛门的护理方法不正确的是
A. 禁忌扩张造口 B. 定时结肠灌洗，训练排便习惯
C. 指导患者避免食用过多的粗纤维食物及产生刺激性气味或胀气的食物
D. 肛门袋宜长期持续使用
E. 发生皮肤黏膜分离时可给予溃疡粉、防漏膏等造口辅助用品
28. Beck三联征：
A. 静脉压降低，<0.49kPa(5cmH₂O)； B. 静脉压增高，>1.47kPa(15cmH₂O)；
C. 心音遥远、脉搏微弱； D. 脉压小，动脉压降低；
E. 脉压增大，动脉压升高。
29. 骨筋膜室综合征处理措施不正确的是
A. 按摩患肢 B. 热敷患肢
C. 局部理疗 D. 高举患肢

- E. 准备切开减压手术
30. 嘱术后病人取半卧位的目的包括
- A. 利于引流，防止隔下脓肿 B. 利于呼吸，增加肺通气量
C. 有利于血液循环 D. 利于排尿
E. 减轻腹壁切口张力

三、病例分析题（将答案填写在答题纸上，共 6 小题，每题 25 分，共 150 分）

1. 李某，男，78岁，因发热、咳嗽、咳痰6天，2天前咳嗽加重，咳黄色黏痰，量较多且不易咳出，诊断为“右下肺炎”收住入院。入院后身体评估：体温39.0℃，脉搏110次/分，律齐，呼吸28次/分，血压130/80mmHg。神志清楚，口唇轻度发绀，无颈静脉怒张，双肺呼吸音粗，闻及干、湿性啰音。入院后予头孢曲松钠、盐酸氨溴索等药物治疗。无糖尿病、冠心病及高血脂。吸烟55年，每天20支左右。

实验室及其他检查：血常规：白细胞 $13.9 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞80.0%；痰培养示：肺炎球菌；动脉血气分析示：pH7.402，PaCO₂40.7mmHg，PaO₂70.5mmHg，SaO₂91.2%；胸部X线检查示：右下肺叶可见密度均匀的阴影。

请分析：

- (1) 病人目前存在主要护理诊断/问题及依据？
- (2) 该病人目前采取适宜的给氧方式和浓度是什么？
- (3) 为帮助病人有效咳嗽排痰，请列出相关的护理措施？

2. 患者，男性，28岁，因黑便4天，呕鲜血1次，伴晕厥及短暂性意识障碍，拟“消化道出血”入院，2小时前呕鲜血约100ml，急查血常规示：RBC $1.79 \times 10^{12}/L$ ，HGB 58g/L；既往有胃病史3年，常常在餐后3-4小时和夜间出现腹痛，外院就诊，未作正规治疗，平时生活无规律，否认其他病史。入院查体：T36.2℃，P98次/分，R20次/分，BP90/44mmHg；意识清，贫血貌，诉头晕、乏力、口干、心慌；剑突下轻压痛，腹平软，肠鸣音7次/分，余无明显阳性体征。

请分析：

- (1) 消化道出血常见原因有哪些？需要协助进一步做何种检查能明确原因？
- (2) 如何估计出血量？
- (3) 目前护理问题有哪些（写3个）？对首优问题列出护理措施？

3. 患者，男性，38岁，因上呼吸道感染，呼吸深快，多饮，多尿2周，食欲减退，恶心，呕吐及腹痛1天就诊。查体：T39℃，P125次/min，R26次/min，BP90/60mmHg。患者呈嗜睡状态，呼吸深快，呼气有烂苹果味，辅助检查：血常规WBC $13.0 \times 10^9/L$ ，N 0.67，L 0.23，血二氧化碳结合力30mmol/L，血糖31.3mmol/L，尿酮体（+++）。

请分析：

- (1) 该病人的临床诊断及其依据？
- (2) 本病人的主要护理诊断是什么？

(3) 主要护理措施有哪些?

4. 孟先生, 45岁, 因“反复右上腹疼痛8年, 突发右上腹疼痛六余小时, 伴寒战高热”急诊入院。查体: 神志欠清、烦躁不安, 皮肤巩膜黄染, 右上腹及剑突下压痛, 轻度肌紧张及反跳痛, Murphy 征(+), 腹稍胀, 未见肠型及蠕动波, 肠鸣音正常。T 39.0°C, P 122次/分, R 26次/分, Bp 82/60mmHg。实验室检查:Hb 156g/L, WBC 29.8×10⁹/L, 总胆红素 31.0μmol/L, 直接胆红素 25.0μmol/L。病人5年前经B超检查证实为胆囊结石曾行排石治疗, 近半年来腹痛发作频繁, 伴有寒战、发热及可疑黄疸。

请分析:

- (1) 列出该病人目前主要护理诊断。
- (2) 目前应采取哪些护理措施?

5. 男性, 42岁, 两周前无意中发现颈前区有一肿块, 无任何不适。体检示: 颈前区偏左有一肿块 3cm×2cm, 质中等, 边界不清, 随吞咽活动, 无触痛, 放射性核素扫描见左甲状腺有一冷结节。临床拟诊“甲状腺占位性病变”收入院, 完善术前准备后行手术治疗; 术后4h, 病人先主诉胸闷、气急, 随后出现颈部增粗, 呼吸困难, 发绀。

请分析:

- (1) 该病人出现呼吸困难的原因是什么?
- (2) 甲状腺术后出现呼吸困难的常见原因有哪些?
- (3) 如何做好该病人的急救护理?
- (4) 预防甲状腺术后病人呼吸困难并发症的措施有哪些?

6. 男性, 40岁, 7年前始出现大便带血, 鲜红色, 量少, 覆盖于粪便表面, 曾于当地医院就诊, 考虑“内痔”并作治疗, 具体不详。近一年来, 病人觉排便后肛门口有肿物脱出, 有时能自行回纳, 但时需用手回纳, 并伴不适、肛周皮肤瘙痒等。数日前感肛门肿物增大, 无法用手回纳, 且疼痛剧烈难忍。肛门检查: 肛周皮肤红肿, 肛门口见一 4cm×5cm×5cm 大小痔团脱出, 明显充血水肿, 无法回纳, 触痛明显。诊断“混合痔并嵌顿”。

请分析:

- (1) 病人入院后应作哪些处理?
- (2) 病人经以上处理后症状缓解, 若拒绝进一步治疗, 护理人员应给予哪些出院指导?
- (3) 若病人行手术治疗, 术后应如何控制排便?

